

CONGRESSO NAZIONALE



Confederazione
Associazioni
Regionali di Distretto

Società Scientifica delle attività
Sociosanitarie Territoriali

ROMA

ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ROMA

ADERENZA SALUTE

4 Regioni a confronto. Best practices per una visione nazionale.
Dalla presa in carico della malattia alla presa in cura della Persona

12 NOVEMBRE
2025

Manuela Petino

Mancata aderenza: gli ostacoli nella visione del medico di famiglia

ADERENZA TERAPEUTICA


Ostacoli nella visione del medico di famiglia

Nello specifico, l'aderenza terapeutica è definibile come il grado di osservanza da parte del paziente dei consigli e delle prescrizioni concordate con il medico, nonché dei suggerimenti di altri operatori di interesse sanitario, in relazione:

- all'assunzione di farmaci, secondo i tempi, le dosi e le modalità stabilite e concordate;
- agli stili di vita salutari e alle correlate modifiche comportamentali;
- al corretto utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti tecnici sanitari;
- all'effettuazione di esami e visite di controllo nei tempi indicati dal medico.



ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia



ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia



ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia




Grafico 3 (elaborato da OsMed 2022).

ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia




Grafico 4 (elaborato da OsMed 2022).

ADERENZA TERAPEUTICA


Ostacoli nella visione del medico di famiglia





Aderenza Terapie Croniche

Describe il livello di aderenza terapeutica ad una serie di terapie croniche, identificando



Acido Bempedoico

Pazienti eleggibili al trattamento con acido bempedoico e valutazione della presa in carico.



AVK e NAO/DOAC (NOTA 97 AIFA)

Pazienti con FAnV che risultano appropriati o inappropriati circa la prescrizione dei




Vitamina D (NOTA 96 AIFA)

Selezione i pazienti per un'appropriata determinazione dei livelli di 25OH vitamina D e la conseguente prescrizio...



BPCO (NOTA 99 AIFA)

Pazienti che risultano appropriati o inappropriati circa la prescrizione di farmaci inalatori (LAMA/LABA/ICS).



Antidiabetici (NOTA 100 AIFA)

Pazienti appropriati o inappropriati circa la prescrizione di farmaci antidiabetici (SGLT2,




Statine (NOTA 13 AIFA)

Pazienti appropriati o inappropriati circa la prescrizione delle statine.



Anti-Osteoporotici (NOTA 79 AIFA)

Pazienti appropriati o inappropriati circa la prescrizione di farmaci anti-osteoporotici.



Antibioticoterapia

Describe l'uso potenzialmente appropriato e inappropriato di antibiotici in pazienti con diagnosi di infezioni delle vie...



ASA - Acido Acetilsalicilico

Pazienti ad alto rischio CV, appropriati per un eventuale trattamento con ASA, valutandone l'aderenza al trattamento.



Appropriatezza diagnostica

Pazienti senza potenziale codifica diagnostica in base alla prescrizione di determinati farmaci ed altri indicatori indiretti.



IPP e anti-H2 (NOTA 1 e 48 AIFA)

Pazienti appropriati o inappropriati circa la prescrizione degli IPP e anti-H2.


ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia




ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia



ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia



ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia

e almeno una registrazione del questionario CAT

Temporalità: ultimi 36 mesi

Codice Indicatore: AC-BPC015

1 / 25 = **4,00%**



e almeno una visita pneumologica

Temporalità: ever

Codice Indicatore: AC-BPC016

8 / 25 = **32,00%**



aderenti alla terapia LABA e/o LAMA (singoli o in associazione) con copertura > 80% anno

Temporalità: ultimi 12 mesi

Codice Indicatore: AC-BPC017


6 / 25 = **24,00%**



con FEV1 >= 80% in terapia con

ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia



MilleGPG Software di gestione dei servizi

Analisi Criticità e Intervento

Pazienti con Criticità

C-DM14: Pazienti diabetici tipo 2 senza almeno una registrazione di emoglobina glicata negli ultimi 365 giorni

Cognome	Nome	Nascita	Sesso	Età
BODEI	ABDERRAHM	01/01/1950	M	61
BONETTA	DINO	07/02/1928	M	83
CIOLINI	MARIA	30/04/1930	F	69
COLABELLA	CARLO	03/03/1933	M	76
DI FELICE	GIUSEPPA	21/01/1926	F	65
FRANZONI	IVANO	08/06/1944	M	66
LA ROSA	ANNA MARIA	10/09/1942	F	66
LAZZAROMI	GIUSEPPE	09/05/1926	M	64
MAESTRI	ALESSANDRO	26/01/1944	M	67
MARZOTTO	TOURA	27/12/1937	F	73
MONTELEONE	YULIANELA	21/12/1924	F	66
NAJ	LUCIANA	03/01/1960	F	51
OLDOFREDI	HAJAR	17/11/1939	F	71
PATUSSI	ESTER	26/12/1939	F	71
PONZONI	HAMZA	17/12/1939	M	71
PONTEFRAZ	MADDAI ENA	17/10/1936	F	74

Stampa Export Cerca Avviso Mail Registro Mail Chiudi

Analisi Criticità e Intervento

2010 Aggiorna Analisi Storno Esporta

Pazienti	Chi sono?
105	Pazienti
57 su 105	Pazienti
0 su 105	Pazienti
20 su 105	Pazienti
11 su 105	Pazienti
26 su 105	Pazienti
105 su 105	Pazienti

Richiamo del paziente che non effettua i controlli necessari per la sua patologia

Generazione di avvisi in (alert warning)

Atteggiamento proattivo del medico di medicina generale

Elenco stampato per il

ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia

Nello specifico, l'aderenza terapeutica è definibile come il grado di osservanza da parte del paziente dei consigli e delle prescrizioni concordate con il medico, nonché dei suggerimenti di altri operatori di interesse sanitario, in relazione:

- all'assunzione di farmaci, secondo i tempi, le dosi e le modalità stabilite e concordate;
- agli stili di vita salutari e alle correlate modifiche comportamentali;
- al corretto utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti tecnici sanitari;
- all'effettuazione di esami e visite di controllo nei tempi indicati dal medico.

ADERENZA TERAPEUTICA

Ostacoli nella visione del medico di famiglia

Fiducia medico-paziente

Alfabetizzazione sanitaria (health literacy)

Monitoraggio attraverso digitalizzazione

Assenza di sintomi

Schemi posologici (no associazioni)

Liste d'attesa – accesso SSN

